

# YO PUEDO SALVAR UNA VIDA



Si una persona no responde,  
no respira o lo hace mal

Evalúe estado de  
**CONCIENCIA**

 **LLAME AL 107 E INFORME**

No responde, no respira  
o respira mal

¿Que pasa?

¿Donde pasa?

¿Cuántas personas  
necesitan ayuda?



**Inicie el RCP**

Fuerte y rápido por 2 minutos  
a 120 compresiones por  
minuto

*(Tanto para niño como  
adulto)*



# RCP



- **Comprima el centro del pecho**
- **Fuerte y rápido**
- **120 por minuto**
- **No interrumpa las compresiones**
- **Solo suspenda RCP cuando llegue el 107 o el paciente se recupere**

## ASFIXIA EN ADULTOS

Mano en el cuello

No puede respirar,  
ni toser, ni hablar

Tiene labios y piel azulado

Preguntarle si se  
está ahogando

**Abrácelo por atrás  
y de compresiones  
abdominales a la  
altura de la boca  
del estómago**



**Si la persona deja de responder  
y sigue atragantada**

**INICIE RCP**  **LLAME AL 107**

# DEA

## Desfibrilador Externo Automático



- **Enciéndalo**
- **Pegue los electrodos/parches al pecho del paciente**
- **Siga las instrucciones**

## ASFIXIA EN NIÑOS



**Coloque al  
niño boca  
abajo, golpee  
fuerte 5  
veces al  
medio de la  
espalda**



**Colóquelo  
boca arriba y  
comprima con  
dos dedos  
fuerte al  
centro del  
pecho**

**Compruebe que el objeto haya  
salido, sino repita la maniobra**